

JP154 甌島列島（こしきじまれっとう）

鹿児島県：薩摩川内市

| | |
|----|----------------------|
| 位置 | N 31° 50′ E 129° 53′ |
| 面積 | 11,910ha |

環境構成【島嶼／森林】

鹿児島県串木野市の西方海上にあり、上甌島・中甌島・下甌島の大きな3つの島といくつかの小島から出来ている。おおよそ北東から南西に連なっている。海岸の出入りが激しく100mに達する海食崖が西海岸に発達している。

上甌島の里集落はトンボロ（陸繋砂州）の上に作られている。上甌島・長目の浜の砂州の内側には4つの潟湖がある。

下甌島の北部は狭く海食崖では、南限のウミネコの繁殖地がある。標高604mの尾岳をはじめ400～500mの山地がちなっている。平野は少なく南部の手打地区で見られるのみである。

選定理由

| | |
|----|-----------|
| A1 | ウチャマセンニュー |
| A2 | カラスバト |

保護指定

サイトの一部（10～49％）に法的な担保がある。

<保護指定の内容>

国定公園（甌島国定公園）、自然環境保全地域

保全への脅威

- ・釣り客の立ち入り
- ・釣り客の残した餌を食べるカラスによる捕食

保全活動

- ・環境教育活動：実施者（日本野鳥の会かごしま県支部）
内容：探鳥会（不定期）
- ・モニタリング調査：実施者（日本野鳥の会かごしま県支部）
内容：調査

見られる鳥

年間 124 種の記録がある。春と秋の渡りにはサシバ、アカハラダカ、ハチクマも多く通過することがわかってきた。冬には、潟湖に飛来するガンカモ類も見られる。山林にメジロも多く生息し以前は密猟も多かったと聞く。またカラスバトも多く生息している。下甌島・鹿島断崖でウミネコが繁殖しており、周辺の小島ではオオミズナギドリ、アマツバメ、ハヤブサ、ウチヤマセンニュウ、カンムリウミスズメの繁殖が知られている。

| | |
|----|--|
| 留鳥 | カイツブリ、オオミズナギドリ、カツオドリ、クロサギ、アオサギ、ミサゴ、トビ、ハヤブサ、キジ、カラスバト、キジバト、ヒヨドリ、イソヒヨドリ、セッカ、ヤマガラ、メジロ、ホオジロ、カワラヒワ、スズメ、ハジブトガラス、ハシボソガラス |
| 夏鳥 | ササゴイ、ウミネコ、ホトギス、アオバズク、ツバメ、ヤブサメ |
| 冬鳥 | ハジロカイツブリ、カンムリカイツブリ、ウミウ、オシドリ、コガモ、ヨシガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ノスリ、チョウゲンボウ、タゲリ、アリスイ、ビンズイ、ジョウビタキ、シロハラ、ツグミ、ホオアカ、カシラダカ、ミヤマホオジロ、アオジ、シメ、ミヤマガラス |
| 旅鳥 | アカガシラサギ、シマアジ、アカハラダカ、サシバ、チゴハヤブサ、メダイチドリ、キョウジョシギ、キアシシギ、シマアカモズ、ノビタキ、オオヨシキリ、メボソムシクイ、コムクドリ |
| 迷鳥 | ナベヅル |



Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community