

# JP115 紀伊長島 (きいながしま)

三重県：紀北町、大紀町

|    |                     |
|----|---------------------|
| 位置 | N 34° 10′ E136° 21′ |
| 面積 | 7,452ha             |

## 環境構成【森林／島嶼／照葉樹林】

海域の離島でカンムリウミスズメ、カラスバト、オオミズナギドリ、ウチヤマセンニュウなど貴重な鳥類が繁殖している。



## 選定理由

|    |                     |
|----|---------------------|
| A1 | カンムリウミスズメ・ウチヤマセンニュウ |
| A2 | カラスバト               |

写真提供：平井正志

## 保護指定

法的な担保がない、もしくはわずか（10パーセント未満）である  
<保護指定の内容>  
国指定鳥獣保護区（紀伊長島）

## 保全への脅威

- ・レジャー釣りによる影響 ボートの航行、繁殖地への上陸
- ・カンムリウミスズメ繁殖地へのドブネズミの侵入の可能性あり。

## 鳥類の個体数、生息環境の現状

- ・ IBA サイトにおける重要な鳥類（IBA 選定基準種）の個体数の変化  
減っている（正確にはわからないが、減っている模様（カンムリウミスズメ）  
カラスバトは最近観察例が少ない。）
- ・ IBA 基準種の個体数のカウント調査実施の有無：無
- ・ IBA 選定基準種の個体数に影響するような、IBA サイト内の重要な生息環境の変化：  
変化がある
- ・ IBA 選定基準種の生息環境：  
悪い（40～70%が最適の状態）
- ・ IBA エリアの保全管理計画の有無：有

## 保全活動

- ・環境管理：実施者（環境省）  
内容：カワウ駆除
- ・環境教育活動（日本野鳥の会三重）
- ・保全活動（日本野鳥の会三重）

## 見られる鳥

|     |   |
|-----|---|
| 留鳥  | カラスバト(離島でおそらく繁殖)、クロサギ、トビ、ミサゴ(冬鳥あるいは留鳥)            |
| 夏鳥  | オオミズナギドリ(離島で繁殖)、ウチヤマセンニュウ(離島でおそらく繁殖)、アマツバメ(離島で繁殖) |
| 冬鳥  | オオセグロカモメ、ヒメウ、ミサゴ(冬鳥あるいは留鳥)                        |
| 旅鳥  | セグロカモメ  |
| その他 | カンムリウミスズメ(離島でおそらく繁殖・冬から初夏まで見られる)                  |

\*紀伊長島の周辺海域は、マリーン IBA（Marine Important Bird and Biodiversity Areas：海鳥の重要生息地）に選定されている

詳しくはこちら <http://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conservation/miba/>

## 関連団体・自治体・施設等

- ・日本野鳥の会三重

