Strix

Journal of Field Ornithology Vol. 27 2011

目 次

原著論文

藤巻裕蔵:北海道における繁殖期の潅木・草原性鳥類の調査時期の検討
石黒雄大・小川詩乃・近藤万里・田中久美子・田中智・廣澤麻里・松川あおい・梶田学・寺川眞理:
クマノミズキとウラジロエノキの結実様式の違いが鳥類の採食樹選択に与える影響 7
小菅丈治:石垣島大浜海岸で観察されたクロツラヘラサギの採餌生態
三科康人・大竹明・金清翔・三科美香・今西貞夫:住宅地における人工物を利用したハッカチョウの
集団営巣31
福井晶子・安田雅俊・金井裕:繁殖期において同所的に観察されやすい森林性鳥類種の組み合せ
三上かつら・山口典之:コマルハナバチによるカラ類の巣の乗っ取り

短 報

渡辺朝一:コハクチョウによるオオバタネツケバナ採食の記録
那須義次・村濱史郎・松室裕之・上田恵介・広渡俊哉・吉安裕:フクロウの巣から発見されたシラホシ
ハナムグリ(鞘翅目,コガネムシ科) 67
多田英行:仏沼におけるチュウヒのヒナの育雛期の行動と餌内容の一例
松井 晋・笠原里恵・三上かつら・森本元・三上修:秋田県大潟村でみつかったスズメの9卵巣 83
千葉一彦・作山宗樹:岩手県沿岸南部におけるオオセッカLocustella pryeriの越冬状況 89
上沖正欣・川路則友・川路仁子・上田恵介:北海道におけるヤブサメ Urosphena squameiceps およ
びセンダイムシクイ Phylloscopus coronatus への赤色卵の托卵例
森本元:日本の高山(亜高山帯)におけるヒヨドリ Hypsipetes amaurotis の出現 105

自然保護アピール

明日香治彦・池野進・渡辺朝一:茨城県下のハス田における防鳥ネットによる野鳥羅網被害の状況

吉田敬太郎:長崎県におけるハイイロガン12羽の観察記録	.25
山口孝:東京都青梅市におけるアオバズクNinox scutulataの生息及び繁殖状況	.29
小荷田行男・浦達也・池野進・川内博・高橋邦年・若田部繁・水野敦子:2008年度 関東地方にお	い
るシラコバトの個体数と個体数密度	35
泉敏彦:積雪期の札幌市におけるギンムクドリ(Sturnus sericeus)の観察記録(2009~2010年)・1	41
井上賢三郎・白石久善・矢次智浩:熊本市金峰山におけるハチクマの雛の形態異常例 1	.47
井上賢三郎・白石久善・河端正太郎・矢次智浩・中尾禎志:熊本市金峰山における非常に遅い	ハ
チクマの繁殖例	.49
吉岡俊朗:青森県におけるワライカモメの観察記録	.55
栄村奈緒子:小笠原群島父島の鳥類相―15年前との比較	.59

訂正情報

渡辺朝一:オオヒシクイに根元食で採食された植物種の訂正	65
	00

		雑 録	
著者紹介	その他		167

報 文

Strix

Journal of Field Ornithology Vol. 27 2011

Chief Editor: Keisuke Ueda Editor: Katsura Mikami

Contents

Original Articles

Fujimaki, Y.: Examination of census period for shrub-grassland bird census during the breeding season in Hokkaido
Yoshii, M. & Yoshii, Ishiguro, Y., Ogawa, S., Kondo, M., Tanaka, K., Tanaka, T., Hirosawa, M.,
Matsukawa, A., Kajita, M. & Terakawa, M.: Morphological difference in fruiting pattern
between <i>Swida macrophylla</i> and <i>Trema orientalis</i> lure different bird species
Kosuge, T.: Foraging behavior of the Black-faced Spoonbill <i>Platalea minor</i> on Öhama, Ishigaki
Island, southwestern Japan
Mishina, Y., Otake, A., Kim, C., Mishina, M. & Imanishi, S.: Colonial breeding of the Crested
Myna Acridotheres cristatellus in the weep holes of an artificial concrete wall in the suburbs 31
Fukui, A., Yasuda, M. & Kanai, Y.: Combinations of sympatric forest bird species based on the
nationwide surveys in the breeding seasons of 1994 and 1999 41
Mikami, K. & Yamaguchi, N.: Displacement of Great Tits Parus major and Varied Tits P. varius
from their nest boxes by breeding bumble bees <i>Bombus ardens</i>
Short Communications
Watanabe,T.: Foraging <i>Cardamine scutata</i> by Bewick's Swan63
Nasu, Y., Murahama, S., Matsumuro, H., Ueda, K., Hirowatari, T. & Yoshiyasu, Y.:
Protaetia brevitarsis (Lewis) (Coleoptera, Scarabaeidae) from the Ural Owl nests in Japan
Tada, H.: A record of the behavior and diet composition of Eastern Marsh Harrier Circus
spilonotus nestlings in Hotoke Marsh, Aomori Prefecture, northern Japan
Matsui, S., Kasahara, S., Mikami, K., Morimoto, G. & Mikami, O.K.: Nine-egg clutch of Tree
Sparrows using a nest box in Akita Prefecture, northern Japan
Chiba, K & Sakuyama, M.: The first record of the Japanese Marsh Warbler <i>Locustella pryeri</i>
wintering in Iwate Prefecture, northern Japan
Kamioki, M., Kawaji, N., Kawaji, K. & Ueda, K.: Reddish cuckoo eggs found on the Asian Stubtail
Urosphena squameiceps and the Eastern Crowned Warbler Phylloscopus coronatus nest in
Hokkaido97

Morimoto, G.: Seasonal	occurrence in abundance of the Brown-eared Bulbul Hypsipetes man	rotis
in a sub-alpine zone,	central Japan	105

Conservation appeal

Asuka,	Н.,	Ikeno,	S.	&	Watanabe,	Т.:	Avian	mortality	due	to	bird	nets	for	lotus	cultivation	ı in
Ibaı	raki F	Prefectu	ıre,	ce	entral Japan											113

Observation Reports

Yoshida, K.: The largest flock of Greylag Geese Anser anser recorded in winter, Isahaya, Nagasaki
Prefecture (Japanese Only)
Yamaguchi, T.: Breeding status of the Brown Hawk Owl <i>Ninox scutulata</i> in Ome, Tokyo (Japanese
Only) 129
Konita, Y., Ura, T., Ikeno, S., Kawachi, H., Takahashi, K., Wakatabe S. & Mizuno, A.: Density of
the Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto of the Kanto region in 2008 in comparison
with historical records (Japanese Only) 135
Izumi, T.: Records of Silky Starling <i>Sturnus sericeus</i> at Sappro in winter 2009 and 2010 (Japanese
Only) 141
Inoue, K., Shiraishi, H. & Yatsugi, T.: An Eurasian Honey Buzzard chick with an eye deformity
fledged at Mt.Kimpo, Kumamoto, southern Japan 147
Inoue, K., Shiraishi, H. Kawabata, S., Yatsugi T. & Nakao, T.: A month delayed breeding of the
Eurasian Honey Buzzard in Kumamoto Prefecture, southern Japan
Yoshioka, T.: The first record of Laughing Gull Larus atricilla in Aomori prefecture, northern
Japan (Japanese Only) 155
Emura, N.: The avifauna in Chichijima Island, the Bonin Islands — Comparison with the record
fifteen years ago. (Japanese Only) 159

Correction Information

Watanabe, T.: Correction of the herb species foraged by the Middendorff's Bean Goose 165